

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES VACCINS FCO

	Espèces cibles	Nom du vaccin	Titulaire	Durée de conservation	Conservation	Conditionnement	Primo Vaccination	Age mini pour la première injection	mode d'injection	Mise en place de l'immunité	Durée de l'immunité	Temps d'attente	Effets Indésirables	PRECISIONS
S E R O T Y P E 1	Bovins	ZULVAC 1 Bovins (inactivé)	FORT DODGE	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C	flacon de 100 ml soit 50 doses	2 injections à 3 semaines d'intervalle	2 mois et demi	2 ml par voie intra-musculaire	15 jours après la 2ème injection	NON ETABLIE	zéro jour	aucun en cas de surdosage (4ml)	vaccin utilisable en cours de gestation Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été étudié Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié
	Bovins	ZULVAC 8 Bovins (inactivé)	FORT DODGE	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C	flacon de 100 ml soit 50 doses	2 injections à 3 semaines d'intervalle	2 mois et demi	2 ml par voie intra-musculaire	25 jours après la 2ème injection	NON ETABLIE	zéro jour	aucun en cas de surdosage (4ml)	vaccin utilisable en cours de gestation Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été étudié Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié
	Petits ruminants	ZULVAC 1 Ovins (inactivé)	FORT DODGE	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C	flacon de 240 ml soit 120 doses	2 injections à 3 semaines d'intervalle	1 mois	2 ml par voie sous-cutanée	24 jours après la 2ème injection	NON ETABLIE	zéro jour	réactions locales (granulomes sous-cutanés) faibles, modérées ou intenses au site d'injection chez 92% des animaux vaccinés mais de courtes durées (1 à 2 jours) Surdosage: réactions locales d'intensités variables au point d'injection avec une durée moyenne de 20 jours.	vaccin utilisable en cours de gestation Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été étudié Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié
S E R O T Y P E 8	Bovins	BOVILIS BTV 8 (inactivé)	INTERVE T	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C Ne pas congeler	flacon de 50 ml soit 50 doses	2 injections à 3 semaines d'intervalle	NON PRECISE	1 ml par voie sous cutanée	21 jours après la 2ème injection	NON ETABLIE	zéro jour	Ne vacciner que les animaux en bonne santé oedemes transitoires au site d'injection	Innocuité du vaccin non établie en cas de gravidité Efficacité en cours de démonstration chez les bovins Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques Avant utilisation placer le vaccin à T° ambiante (15 - 25°C) <u>Rappels:</u> à intervalles inférieurs à 12 mois (validité du schéma vaccinal non démontrée)
	ovins	BOVILIS BTV 8 (inactivé)	INTERVE T	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C Ne pas congeler	flacon de 50 ml soit 50 doses	1 injection	NON PRECISE	1 ml par voie sous cutanée	21 jours après l'injection	NON ETABLIE	zéro jour	idem	idem
	Bovins	BTVPUR AISAP 8 (inactivé)	MERIAL	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C Ne pas congeler	flacon de 100 ml soit 100 doses	2 injections à 1 mois d'intervalle	1 mois excepté chez les jeunes nés de mères vaccinées (2,5 mois)	1 ml par voie sous cutanée	23 jours après la 2ème injection	NON ETABLIE	zéro jour	Ne vacciner que les animaux en bonne santé Légère réaction inflammatoire au site d'injection	Innocuité du vaccin non établie en cas de gravidité Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été étudié Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié <u>Rappels:</u> 1 injection chaque année (validité du schéma vaccinal non démontrée)
	ovins	BTVPUR AISAP 8 (inactivé)	MERIAL	1 an <u>après ouverture:</u> à utiliser immédiatement	à l'abri de la lumière + 2°C < T° < + 8°C Ne pas congeler	flacon de 100 ml soit 100 doses	1 injection	1 mois excepté chez les jeunes nés de mères vaccinées (2,5 mois)	1 ml par voie sous cutanée	31 jours après l'injection	NON ETABLIE	zéro jour	idem	idem

pour info :
les prix fixés par la commission bipartite 61 (part de l'éleveur)

1ère injection, 1,67
2ème injection, la moitié, soit 0,835
plus le prix du vaccin (50 % pris en compte par la CE)
soit pour l'Orne 1,6 à 2 millions d'euros pour 2009...
...l'aide à l'élevage en difficultés annoncée par Barnier : 540 000

total 2,50